

Вопросы по психофармакологии

1. Выбор препарата в первую очередь определяется:
 - а) механизмом действия на нейромедиаторные системы
 - б) спектром побочных эффектов*
 - в) сопутствующей патологией
 - г) предпочтением пациента и (или) врача
2. Не требует титрования дозы:
 - а) оланзапин
 - б) кветиапин
 - в) палиперидон*
3. Какой препарат по механизму действия является дофамино-серотониновым стабилизатором:
 - а) клозапин
 - б) арипипразол*
 - в) zipразидон
 - г) галоперидол
4. У пациентов с сопутствующей сердечно-сосудистой патологией препаратом выбора может быть:
 - а) ТЦА
 - б) венлафаксин
 - в) мirtазапин*
5. Высокий риск нарушения функции почек имеется при назначении:
 - а) сертиндола
 - б) кветиапина
 - в) фенотиазинов
 - г) амисульприда*
6. Пациенту с патологией печени предпочтительнее назначить все препараты, кроме:
 - а) арипипразол
 - б) зуклопентиксол
 - в) сульприде
 - г) фенотиазины*
7. По фармакодинамическому эффекту к инцизивным традиционным нейрoлептикам относятся:
 - а) бутирофенон*
 - б) хлорпротиксен
 - в) хлорпромазин
8. Удлинение QT более характерно для:

- а) фенотиазинов
- б) клозапина
- в) тиоридазина*

9. Мониторинг безопасности при терапии атипичными антипсихотиками включает все исследования, кроме:

- а) ИМТ
- б) липидов, холестерина крови -
- в) глюкозы крови
- г) анализ мочи на микрофлору*

10. Указать нерекомендуемую комбинацию лекарственных средств вследствие выраженности холинолитического эффекта:

- а) аминазин + амитриптилин*
- б) аминазин + СИОЗС
- в) аминазин + галоперидол
- г) хлорпротиксен + МАО

11. Какие препараты имеют в спектре неблагоприятных побочных реакций агранулоцитоз, нейтропению:

- а) карбамазепин*
- б) дулоксетин
- в) аминазин

12. Какая лекарственная комбинация не рекомендуется вследствие нарушения картины крови:

- а) тиоридазин + лития карбонат
- б) кветиапин + венлафаксин
- в) клозапин + карбамазепин*
- г) оланзапин + сертралиит