

Тестовые задания для проведения аттестации врачей-психотерапевтов (дополнительные задания к тестам по психиатрии)

1. К рациональной психотерапии относят следующие методики, кроме
 - 1) "умышленного пренебрежения"
 - 2) "субординационно-авторитарных реакций"
 - 3) "имаготерапии"*
 - 4) "возбуждающих воспоминаний"
 - 5) "сократического диалога"

2. Психокорректирующими факторами, действующими в процессе групповой психотерапии, являются все перечисленные, кроме
 - 1) чувства общности с группой
 - 2) снижения эгоцентризма
 - 3) гетеросуггестии*
 - 4) самораскрытия
 - 5) обратной связи

3. Основными задачами, решаемыми в процессе групповой психотерапии, являются
 - 1) отработка элементов коммуникативной деятельности
 - 2) тренировка нарушенных функций
 - 3) переоценка иерархии значимых ценностей
 - 4) все перечисленные*
 - 5) ничего из перечисленного

4. В психотерапевтическом кабинете наркологического диспансера проводятся все следующие лечебно-профилактические мероприятия, кроме
 - 1) групповой психотерапии
 - 2) семейной психотерапии
 - 3) гипносуггестивной психотерапии
 - 4) аутогенной тренировки
 - 5) диспансерного наблюдения больных алкоголизмом*

5. Основными задачами психотерапевтического кабинета общесоматической поликлиники являются
 - 1) консультативно-диагностический отбор больных для лечения в кабинете
 - 2) оказание медицинской помощи психотерапевтическими методами, при необходимости - в комбинации с медикаментозными и физическими методами лечения
 - 3) и то, и другое*
 - 4) ни то, ни другое

6. Организация амбулаторной психотерапевтической помощи представлена следующими формами

- 1) психотерапевтические кабинеты общесоматических поликлиник
- 2) психогигиенические кабинеты студенческих поликлиник
- 3) кабинеты психогигиены и психопрофилактики при МСЧ на предприятиях с особыми условиями производства
- 4) кабинеты социально-психологической помощи (суицидологическая служба)
- 5) всеми перечисленными*

7. В психотерапевтическом кабинете психоневрологического диспансера проводится лечение всех следующих контингентов больных, кроме

- 1) больных с невротическими расстройствами
- 2) больных с нарушениями соматических функций психогенной этиологии
- 3) лиц с острыми реакциями на стресс и адаптационными реакциями
- 4) больных с манифестными психотическими расстройствами*
- 5) больных с расстройствами личности

8. Стационарная психотерапевтическая помощь показана всем следующим контингентам больных, кроме

- 1) больных с хроническими, тяжелыми формами неврозов
- 2) больных с невротическими расстройствами на фоне органической патологии ЦНС
- 3) больных с невротическими реакциями*
- 4) больных, для которых повседневное социальное окружение является источником декомпенсации

9. Групповая психотерапия противопоказана всем перечисленным больным, кроме больных

- 1) с пароксизмальными состояниями различного генеза (истерические, эпилептические, диэнцефальные)
- 2) с гиперкинезами и тиками
- 3) с истерическими двигательными нарушениями (астазия-абазия, параличи, парезы)
- 4) со всем перечисленным*

10. К индивидуальным методам психотерапии алкоголизма относятся

- 1) рациональная психотерапия
- 2) ситуационно-психологический тренинг
- 3) внушение наяву
- 4) гипнотерапия
- 5) все перечисленные*

11. К групповым методикам психотерапии алкоголизма относятся все перечисленные, кроме

- 1) гипнотерапии
- 2) функциональной тренировки*

- 3) аутотренинга
- 4) ситуационно-психологического тренинга

12. Обучение больных алкоголизмом аутогенной тренировке позволяет

- 1) притупить первичное патологическое влечение к алкоголю
- 2) устранить вторичное патологическое влечение к алкоголю
- 3) уменьшить эмоциональное напряжение
- 4) мобилизовать волевые ресурсы
- 5) все перечисленное, кроме 2)*

13. Применением метода рациональной психотерапии у больных алкоголизмом можно

- 1) уменьшить проявление алкогольной анозогнозии
- 2) аутоидентифицировать первичное патологическое влечение к алкоголю
- 3) выработать навыки поведения, препятствующие срыву ремиссии
- 4) провести ценностную переориентацию
- 5) все перечисленное верно*

14. Применение методики стрессопсихотерапии больных алкоголизмом в амбулаторных условиях (по А.Р.Довженко) показано всем перечисленным группам больных, кроме больных

- 1) высказывающих добровольное желание лечиться
- 2) проходящих принудительное противоалкогольное лечение*
- 3) явившихся на лечение в трезвом виде, не менее, чем с двухнедельным воздержанием от алкоголя
- 4) на любой стадии алкоголизма

15. Абсолютными противопоказаниями к применению метода стрессопсихотерапии алкоголизма являются

- 1) делириозное состояние
- 2) исходная стадия алкоголизма
- 3) аментивное состояние
- 4) абстинентный синдром
- 5) все перечисленные, кроме 2)*

16. Организации психотерапевтической помощи в настоящее время свойственны все следующие тенденции, кроме

- 1) приближения к обслуживаемому населению как в территориальном, так и в социально-психологическом отношении
- 2) внедрения в общесоматические лечебно-профилактические учреждения
- 3) доминирования стационарной психотерапевтической помощи*
- 4) доминирования амбулаторной психотерапевтической помощи

17. Психоанализ возник в 1880 г. с изучения (верно одно утверждение)

- 1) Обсессивно - компульсивного невроза

- 2) Маниакально- депрессивного психоза
- 3) Истории
- 4) Состояний с тревогой (страхом)
- 5) Фобий*

18. К методам психотерапии в системе психогигиенических мероприятий в быту относятся:

- 1) Аутогенная тренировка
- 2) Трансцендентальная медитация
- 3) Семейная психотерапия
- 4) Все перечисленное*

19. Техника аутогенной тренировки (по Шульцу) состоит из следующих упражнений (верно все, кроме одного)

- 1) Тяжесть в руках и ногах
- 2) Упражнение «гусиная кожа»
- 3) Тепло в области «солнечного сплетения»
- 4) Тепло в руках и ногах
- 5) Произвольная регуляция ритма сердечной деятельности*
- 6) Регуляция ритма и глубины дыхания
- 7) Прохлада в области лба

20. Специфические психотерапевтические процессы в библиотерапии характеризуются / по А.Е. Алексейчику/

- 1) Вытеснение (конверсия)*
- 2) Контроль над психическими процессами
- 3) Эмоциональная переработка
- 4) Тренировка психических процессов
- 5) Разрешение конфликта

21. Основные задачи, решаемые в процессе групповой психотерапии

- 1) Отработка элементов коммуникативной деятельности
- 2) Тренировка нарушенных функций
- 3) Переоценка иерархии значимых ценностей
- 4) Все перечисленное*

22. Основные фазы развития группы в процессе эмоционально-стрессовой психотерапии (верно все, кроме одного)

- 1) Адаптационная фаза
- 2) Фаза реципрокного торможения*
- 3) Фрустрационная фаза
- 4) Конструктивная фаза
- 5) Реализационная фаза

23. По А. Форелю, в гипнотическом состоянии определяются следующие стадии (верно все, кроме одного)

- 1) Легкий гипноз*
- 2) Сонливость
- 3) Гипотаксия
- 4) Сомнамбулизм

24. К осложнениям гипнотерапии относятся (верно все, кроме одного)

- 1) Истерический припадок
- 2) Амнезии гипнотического состояния*
- 3) Спонтанный сомнамбулизм
- 4) Гипнотическая летаргия
- 5) Гипномания

25. Удлиненный сеанс гипноза /по В.Е. Рожнову/ продолжается (верно одно утверждение)

- 1) 30 мин.
- 2) 1,5 - 2 часа*
- 3) 3 часа
- 4) 8 - 10 часов

26. Коллективная эмоционально-стрессовая гипнотерапия б-х алкоголизмом /по В.Е.Рожнову/ показана следующим больным (верно одно утверждение)

- 1) С высокой степенью гипнабельности
- 2) Всем больным, независимо от степени гипнабельности*
- 3) Больным с исходной стадией алкоголизма

27. Возникновение гипнотического состояния характеризуется (верно все, кроме одного)

- 1) Снижением кровяного давления
- 2) Учащением пульса*
- 3) Замедлением частоты пульса
- 4) Урежением ритма дыхания

28. Психогигиена семьи и сексуальной жизни включает в себя все указанные понятия (кроме одного)

- 1) Профилактика разводов
- 2) Санитарное просвещение в области сексуальных отношений
- 3) Планирование семьи
- 4) Половое воспитание
- 5) Оказание медицинской помощи пациентам с сексуальными расстройствами*

29. Психогигиена трудового коллектива направлена на (верно все, кроме одного)

- 1) Оздоровление психологического климата в коллективе
- 2) Подбор психологически совместимых лиц в функциональные группы, участвующих в производстве лиц
- 3) Обеспечение равномерного ритма трудовых процессов
- 4) Оптимизацию физических свойств производственной среды*

30. Месту психотерапии в системе психогигиенических мероприятий можно дать следующую оценку (верно одно утверждение)

- 1) Психотерапия полностью исчерпывает систему психогигиенических мероприятий
- 2) Психотерапия не входит психогигиенические мероприятия
- 3) Психотерапия является частью психогигиенических мероприятий*

31. К способам определения внушаемости относятся (верно все, кроме одного)

- 1) Метод «падения назад и вперед»
- 2) Внушение произвольного смыкания рук
- 3) Метод «магнита»*

32. При погружении в гипнотическое состояние применяются воздействия на (верно все, кроме одного)

- 1) Обонятельный анализатор
- 2) Кожный анализатор
- 3) Зрительный анализатор*
- 4) Слуховой анализатор

33. Гипноз – отдых /по К.И. Платонову/ показан больным со следующими расстройствами (верно все, кроме одного)

- 1) Бессоница
- 2) Гипотония*
- 3) Астения
- 4) Эмоционально-гиперастеническая слабость

34. Показаниями к проведению наркопсихотерапии является

- 1) Пониженная внушаемость и гипнабельность
- 2) Недостаточная контактность
- 3) Отсутствие эффекта после проведения других психотерапевтических мероприятий
- 4) Все перечисленное*

35. К методам поведенческой психотерапии относятся (верно все, кроме одного)

- 1) Систематическая десенсибилизация
- 2) Метод «погашения реакций»
- 3) Медитация*

- 4) Выработка отвращения (аверсионная терапия)
36. Что составляет принцип лечебной триады академика В.М.Бехтерева?
- 1) Психотерапевтическая беседа, сеанс гипноза и обучение самовнушению*
 - 2) Наркопсихотерапия, игровая психотерапия, психотерапия творчеством
 - 3) Коллективная терапия, эмоционально-стрессовая, релаксация
37. Балинтовская группа создается для:
- 1) Тестирования пациентов
 - 2) Ролевого тренинга врачей*
 - 3) Снятия заикания
38. Творцом метода отвлекающей психотерапии является:
- 1) С.С.Либих*
 - 2) Р.А.Лурия
 - 3) В.М.Бехтерев
39. Автор психодрамы, как метода групповой психотерапии:
- 1) Ф.Перлз
 - 2) Ж.Морено*
 - 3) Э. Берн
40. Нейролингвистическое программирование, это:
- 1) Метод определения внушаемости
 - 2) Модель внутреннего опыта коммуникации и поведения*
 - 3) Разновидность либротерапии
41. Какую систему восприятия в НЛП определяют предикаты:
- 1) репрезентативную*
 - 2) референтную
 - 3) ведущую
42. Основоположником теории транзактного анализа является:
- 1) З.Фрейд
 - 2) Ф.Перлс
 - 3) Э.Берн*
43. Основные принципы практического транзактного анализа:
- 1) контрактный метод
 - 2) метод открытой коммуникации
 - 3) оба метода*
44. Принцип "открытой коммуникации" в транзактном анализе - это:

- 1) полная информированность специалиста и клиента о том, что происходит в их совместной работе*
 - 2) обязательная полная искренность клиента
 - 3) изучение клиентом основ ТА
45. Эго-состояние в трансактном анализе - это:
- 1) проявление чувств и поведений
 - 2) проявление мыслей
 - 3) проявление поведений, мыслей и чувств в данный момент времени*
46. Соответствие требованиям окружающих - это поведение с позиций трансактного анализа:
- 1) Свободного Ребенка
 - 2) Бунтующего Ребенка
 - 3) Адаптивного Ребенка*
47. Основатель гештальт-терапии:
- 1) Карл Густав Юнг
 - 2) Фредерик Соломон Перлз*
 - 3) Вингельм Райх
48. Философские основы гештальттерапии:
- 1) диалектический материализм
 - 2) субъективный идеализм*
 - 3) экзистенциализм
49. Гештальт-терапия есть:
- 1) терапевтический вариант гештальт-психологии*
 - 2) эклектическое сочетание различных методов психотерапии
 - 3) результат творческой переработки наиболее эффективных психотерапевтических концепций